

ノロウイルスによる 感染・食中毒を防ぎましょう!!

この冬、**新型ノロウイルスの流行の拡大**が予想されます


※新規遺伝子型ノロウイルス GII.17

予防が大切

京都市内の感染者の推移

感染性胃腸炎(ノロウイルスを含む)の報告数の推移
～市内41協力医療機関当たりの報告数～

11月に入ると急増!!



調理する前、
食べる前には **石けんで手洗い**を!!

食品は中心温度
85℃～90℃で90秒以上 **加熱**を!!

台所用漂白剤を薄めた消毒液
を使って食器や器具の **消毒**を!!

※台所用漂白剤＝次亜塩素酸ナトリウム ※キャップ1杯(約5ml)の台所用漂白剤(5%)を1Lの水で薄めてください



こんな症状に注意

下痢, 嘔吐, 腹痛

などが、主な症状で、37～38℃
の発熱を伴うこともあります。潜
伏期間は12～48時間で、発症
後およそ2～3日で軽快します。



新規遺伝子型ノロウイルス GII.17 の対策は、これまでのノロウイルスと同じです。

発行月：平成 27 年 12 月発行 京都市印刷物第 272270 号
問合せ先：京都市保健福祉局保健医療課 TEL.075-222-4244 FAX.075-222-3416